

Tabelle 11: LSV Wintergerste 2014 – Eigenschaften

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

	Reife	eingetragen seit	Vermehrungsfl. LWK Nds. (Angaben in ha)			Anbauregion						Festigkeit gegen																	
			2013	2014	2015	1	6	8	12	14	15	Ähr./ m²	Kö./Ähre	TKG	Sort.> 2,2mm hl-Gew.	Halmlänge	Standfestigkeit	Halm-knick.	Ähren-knick.	Auswinterun g	Mehltau	Netzfleck.	Rhyncho	Zwergrost					
<b>mehrzeilige</b>																													
Lomerit		GMV	m	2001	235	238	155					X			-	+	+	o	+	-	--	-	o	+	o	-	-	-	
Leibniz		GMV	msp	2007	175	74	47							X	-	+	+	+	+	-	o	-	-	o	o	+	+	+	--
Nerz		2xGMV	sp	2008	38	12	37	X					X		-	o	+	+	o	o	-	o	o	+	+	o	o	+	
Pelican		GMV	msp	EU	19	13	14	X						X	o	+	+	o	-	o	-	--	-	o	o	-	+	+	
KWS Meridian		GMV	m	2011	248	358	414				X	X			-	+	+	++	o	o	-	o	o	+	-	o	+	+	
KWS Tenor		GMV	m	2011	261	410	319	X	X	X	X	X			-	o	++	++	o	-	o	+	-	+	+	--	++	+	
SY Leo	Hy.	GMV	m	2012	365	117	-	X						X	-	++	--	o	+	o	-	-	--	o	o	o	+	--	
Antonella		GMV	m	2012	30	27	31		X						o	+	+	+	o	o	o	-	-	+	++	++	++	+	
KWS Keeper		2xGMV	msp	2013	75	219	247				X			X	-	++	o	+	+	--	o	o	+	+	o	o	+	+	
Loreley		GMV	msp	2013	33	77	12		X						--	+	+	+	o	o	+	o	o	+	++	+	o	++	
Galation	Hy.	GMV	m	EU	55	270	208		X			X			o	++	-	++	+	o	+	+	-	o	+	o	+	-	
Wootan*	Hy.	GMV	m	2014	10	121	29	P	P	P	P	P	P	P	--	+++	-	o	+	-	o	o	-	o	+	+	+	--	
Quadriga*		GMV	m	2014	0	76	368	P	P	P	P	P	P	P	--	++	++	+	+	-	+	+	o	o	o	o	+	o	
Tamina*		GMV	m	2014	0	25	17				P				o	+	-	+	+	-	+	+	+	o	++	o	+	++	
<b>zweizeilige</b>																													
Matros			m	2011	120	147	188	X	X	X	X	X	X		++	-	+	-	+	o	-	o	+	+	++	-	+	++	
California		GMV	m	2012	247	338	384			X					+	-	++	+	+	+	+	++	+	o	o	+	+	o	
KWS Glacier		GMV	m	2014	59	118	86	X							++	-	+	+	++	++	o	o	++	-	-	o	+	+	

o = durchschnittlich + = überdurchschnittlich -- = unterdurchschnittlich \*= vorläufige Beurteilung

1) = bisher nicht ermittelt oder nicht eingestuft

2) noch nicht abschließend zu beurteilen P= Probeanbau

Quelle: Alle Sortenversuche des Bundesgebietes (Beschreibende Sortenliste), Versuche der LWK Niedersachsen stärker berücksichtigt.

Sorte	im Handel seit	Reifezeit	Anbauregion						Vermehrungsfläche LWK Niedersachsen (Angaben in ha)			Ähren je m <sup>2</sup>	Körner je Ähre	TKG	Halm-länge (+=kurz)	Festigkeit gegen							Auswin-terung	
			1	6	8	12	14	15	2013	2014	2015					Lager	Mehl-tau	Braun-rost	Gelb-rost	Blatt-septoria	Spelzen-bräune	DTR		Ähren-fusarium
<b>A</b>																								
JB Asano	2008	fr	x	x	x	x	x	x	756	695	568	o	o	++	o	o	+	o	--	--	-	o	-	-
Julius	2008	m	x	x	x	x	x	x	775	506	531	+	-	+	o	+	o	+	++	+	o	o	o	++
Linus	2010	m				x		x	169	193	136	o	++	o	+	+	o	o	+	o	o	-	o	o
RGT Reform*	2014	m	P		P	P	P	P	0	161	639	+	o	+	++	+	+	+	+	+	o	o	+	o
Boregar* (Gr)	2013	m			x			x	0	5	59	+	-	+	+	o	+	-	+	o	1)	1)	1)	1)
<b>B</b>																								
Mulan	2006	m				x			123	53	46	+	o	o	o	o	o	-	+	-	o	o	+	o
Smaragd	EU	m		x	x	x	x	x	40	26	65	o	++	o	o	--	o	+	+	o	o	-	-	o
Matrix	2010	m			x	x			393	445	248	+	o	o	+	o	o	-	--	o	o	-	+	+
Desamo	2013	m						x	72	99	157	+	++	-	+	o	+	++	++	+	o	+	o	++
KWS Loft*	2014	m						P	10	103	124	o	++	o	+	-	++	++	--	++	o	o	+	o
Johnny*	2014	m					P		0	87	171	-	++	+	+	+	++	+	+	+	o	+	+	-
Rumor	EU	m				x		x	48	438	419	++	+	-	o	o	+	+	o	o	1)	o	+	+
<b>C</b>																								
Lear	2010	s	x	x	x	x		x	114	79	49	o	++	-	+	-	++	++	+	+	+	o	o	o
Elixer	2012	m	x	x	x	x	x	x	373	513	478	o	++	-	o	-	+	++	++	+	o	-	+	+
Anapolis	2013	m	x	x	P	x	x	x	201	618	573	+	+	+	++	+	++	+	++	+	o	o	+++	-
Landsknecht*	2013	m				P			16	59	46	+	++	-	o	-	o	++	-	+	o	o	+	o
Ohio*	2014	m	P		P	P	P	P	-	-	-	o	o	++	o	o	+	++	++	+	o	o	-	o
Sarmund*	2014	m			P	P			13	75	19	+	+	o	+	+	++	+	o	o	o	o	+	o

o = durchschnittlich += überdurchschnittlich -- = unterdurchschnittlich \* = vorläufige Beurteilung '1) = noch nicht ermittelt bzw. eingestuft P= Probeanbau